



Ελληνική Δημοκρατία  
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  
Ίδρυμα Ηπείρου

# Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία

## Ενότητα 12: Ασθένειες που Σχετίζονται με Λογοπαθολογικές Διαταραχές

Ταφιάδης Διονύσιος



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Τμήμα Λογοθεραπείας

## Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία 3

Ενότητα 12: Ασθένειες που Σχετίζονται με  
Λογοπαθολογικές Διαταραχές.

Ταφιάδης Διονύσιος

Εργαστηριακός Συνεργάτης

Ιωάννινα, 2015



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



# Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.



# Χρηματοδότηση

- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «**Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση**» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
- Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



# Σκοποί ενότητας

- Αναφορές ενδεικτικές σε κοινές νόσους που απαντώνται πιο συχνά και σχετίζονται άμεσα με λογοπαθολογικές διαταραχές.



# Περιεχόμενα ενότητας

- Εισαγωγή
- Κοινές Ασθένειες



# Εισαγωγή



# Εισαγωγή (1 από )

- Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι η κάθε κατάσταση και πώς μπορεί να επηρεάσει τις ικανότητες επικοινωνίας του εκάστοτε ασθενούς. Να έχετε στο μυαλό σας ότι οι περισσότερες ασθένειες ή συνθήκες έχουν δυναμική συμμετοχή στην ανάπτυξη των διαταραχών του λόγου και της ομιλίας.



## Εισαγωγή (2 από )

- Αυτό ισχύει ειδικά για παιδιά με συχνές ή πολλές περιόδους με ακουστικές απώλειες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου απόκτησης της γλωσσικής ικανότητας, ή για παιδιά τα οποία χάνουν συχνά τα μαθήματά τους στο σχολείο και τώρα έχουν μια επιβράδυνση της ανάπτυξής τους κοινωνικά, μορφωτικά και στην επικοινωνία τους ως προς τους άλλους συμμαθητές τους.



## Εισαγωγή (3 από )

- Μια νόσος η οποία αποκτάται κατά την εγκυμοσύνη, μπορεί επίσης να επενεργήσει στη τυπική ανάπτυξη ενός αγέννητου παιδιού. Συγκεκριμένες βλάβες κατά την εμβρυική ανάπτυξη σχετίζονται με τη χρονική στιγμή στην οποία εμφανίζεται η νόσος κατά την κύηση. Τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά ρίσκα συμβαίνουν κατά το πρώτο τρίμηνο. Πολλές σύμφυτες διαταραχές σχετίζονται με βλάβες του λόγου και της ομιλίας.



# Κοινές Ασθένειες

# Κοινές Ασθένειες (1 από 35)

- Αδενοειδεκτομή
- Η αδενοειδεκτομή είναι μερική ή πλήρης χειρουργική αφαίρεση των αδενοειδών. Αυτή η διαδικασία προτείνεται συνήθως όταν οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις των παιδιών είναι υπερμεγέθεις και εμποδίζουν το ρινοφάρυγγα ή τις ευσταχιανές σάλπιγγες. Η απόφραξη αυτή έχει συχνά ως αποτέλεσμα δυσκολίες στην αναπνοή ή συχνών επεισοδίων ωτίτιδας.

## Κοινές Ασθένειες (2 από 35)

- Αδενοειδεκτομή
- Το παιδί μπορεί να έχει μια παρατεταμένη περίοδο απώλειας της ακοής του εξαιτίας μέσης ωτίτιδας της αδενοειδεκτομής.
- Η υπερϊοφαρυγγική ανεπάρκεια η οποία προκαλεί υπερρινικότητα μπορεί να παρούσα, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις.

# Κοινές Ασθένειες (3 από 35)

- Αλλεργίες
- Οι αλλεργίες είναι οι υπερευαισθησίες που παρουσιάζονται σε ουσίες που τρώμε, εισπνέουμε, ενίωνται ή έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Τα συμπτώματα είναι αλλεργικά επεισόδια τα οποία συχνά περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, σοκ, υπερβολική παραγωγή βλέννης, συστολή των βρόγχων και αντιδράσεις του δέρματος όπως ερυθρότητα, φαγούρα και φλεγμονή.

# Κοινές Ασθένειες (4 από 35)

- Αλλεργίες
- Υγρό στο μέσο ους μπορεί να συμβαίνει πιθανά από αποτέλεσμα απώλειας ακοής και συσχετιζόμενες γλωσσικές διαταραχές.

# Κοινές Ασθένειες (5 από 35)

- Άσθμα
- Το άσθμα χαρακτηρίζεται από περιοδικά επεισόδια, όπως σφιξίματα στο στήθος και δυσκολίες στην αναπνοή. Μπορεί να πυροδοτείτε από τις αλλεργίες, συναισθηματικό στρες, λοιμώξεις, χρήση ναρκωτικών ουσιών, εισπνοή διεγερτικών ουσιών, έντονη άσκηση ή ψυχοσωματικές διαταραχές. Το άσθμα παρουσιάζεται συχνά μεταξύ της παιδικής ηλικίας και υπάρχει μία διάθεση να αυξάνεται με το πέρασ του χρόνου. Το άσθμα συνήθως είναι υπό έλεγχο με φαρμακευτική αγωγή.



# Κοινές Ασθένειες (6 από 35)

- Άσθμα
- Αιφνίδια και επανειλημμένα επεισόδια μπορεί να προκαλέσουν χαμηλή οξυγόνωση του σώματος και μόνιμη ανικανότητα.



# Κοινές Ασθένειες (7 από 35)

- Ανεμοβλογιά (Βαρικέλα)
- Η ανεμοβλογιά είναι μία ήπια λοιμώδης ασθένεια η οποία προκαλείται από έναν ερπητοϊό. Το πρωταρχικό σύμπτωμα είναι ένα εξάνθημα το οποίο εμφανίζεται κυρίως στο δέρμα και γραμμώσεις στο στόμα και το λαιμό. Η ανεμοβλογιά πρωτίστως επηρεάζει παιδιά μεταξύ 5 και 9 χρόνων. Είναι σπάνια στους εφήβους και στους ενήλικες. Στα παιδιά, η ανάρρωση είναι συνήθως γρήγορη (7 – 10 μέρες), ενώ οι έφηβοι και οι ενήλικες είναι πιο επιρρεπείς σε επιπλοκές και έχουν πιο αργή ανάρρωση. Ανοσοποίηση είναι διαθέσιμη για άτομα άνω των 12 μηνών.

# Κοινές Ασθένειες (8 από 35)

- Ανεμοβλογιά (Βαρικέλα)
- Η ανεμοβλογιά είναι συχνά μια ήπια ασθένεια. Σε σπάνιες περιπτώσεις σχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές, όπως το σύνδρομο Reye, την πνευμονία, την εγκεφαλίτιδα ακόμα και το θάνατο.
- Εάν τα εξανθήματα της ανεμοβλογιάς εμφανιστούν στα αυτιά, μπορεί να υπάρξουν κάποια τοξικά συμπτώματα τα οποία προκαλούν αμφοτερόπλευρη απώλεια ακοής.

# Κοινές Ασθένειες (9 από 35)

- Κοινό Κρυολόγημα
- Το κοινό κρυολόγημα συχνά προκαλείται από μία μόλυνση από ιό στη μύτη και/ή στο λαιμό, όπως επίσης μπορεί να σχετίζονται και ο λάρυγγας και οι πνεύμονες. Στα συμπτώματα περιέχονται ρινική απόφραξη, καταρροή, φτέρνισμα, ήπια συμπτώματα τραχύτητα λαιμού, υγρά μάτια, βήχα, κοιλιακό άλγος και βραχνάδα.

# Κοινές Ασθένειες (10 από 35)

- Κοινό Κρυολόγημα
- Μπορεί να παρατηρηθεί μία προσωρινή βαρηκοΐα αγωγιμότητας. Το κρύωμα συχνά συμβαίνει τους χειμερινούς μήνες όπου τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή στο να προσβληθούν. Η θωράκιση των παιδιών απέναντι στους ιούς του κρυολογήματος βελτιώνεται καθώς μεγαλώνουν, γι' αυτό η συχνότητα της λοίμωξης και της σοβαρότητας μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.

# Κοινές Ασθένειες (11 από 35)

- Κοινό Κρυολόγημα
- Το κρυολογήματα δεν είναι κάτι σοβαρό στις περισσότερες των περιπτώσεων, παρότι η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί στο μέσο ους, στο λάρυγγα, στην τραχεία, στους πνεύμονες ή στα ιγμόρεια. Αυτό μπορεί να επιφέρει δευτερεύουσα βακτηριδιακή λοίμωξη με επιπλοκές όπως λαρυγγίτιδα, βρογχίτιδα, μέση ωτίτιδα και ιγμορίτιδα.

# Κοινές Ασθένειες (12 από 35)

- Κοκίτης
- Ο κοκίτης είναι μία προερχόμενη από ιό διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από έναν βήχα σαν «γαύγισμα», από βραχνάδα, από αναπνευστική εξάντληση και από ένα συριγμό που προέρχεται από μία φλεγμονή του λάρυγγα και της τραχείας.

# Κοινές Ασθένειες (13 από 35)

- Κοκίτης
- Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επιπλοκή γρίπης ή κρυώματος. Μπορεί επίσης να προκληθεί από αλλεργική αντίδραση.
- Ο κοκίτης έχει συμπτώματα κυρίως τη νύχτα και υποχωρεί μετά από μερικές ώρες. Αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί για μερικές μέρες και είναι πιο συχνή τις χειμερινές μέρες.



# Κοινές Ασθένειες (14 από 35)

- Κοκίτης
- Η οξεία φάση του κοκίτη είναι μία ένδειξη της επιγλωττίτιδας, η οποία μπορεί να είναι και θανάσιμη.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να μειωθεί η οξυγόνωση του σώματος και να προκληθεί μόνιμη βλάβη. Η επείγουσα τραχειοτομή μπορεί να είναι απαραίτητη.

# Κοινές Ασθένειες (15 από 35)

- Εκκρίσεις ωτός
- Οι εκκρίσεις ωτός δεν είναι ασθένεια, αλλά κοινό σύμπτωμα μίας συγκεκριμένης διαταραχής. Το πρασινοκίτρινο έκκριμα από το ακουστικό πόρο μπορεί να είναι ένδειξη εξωτερικής ωτίτιδας, μέσης ωτίτιδας ή μαστοειδίτιδας. Το άτομο το οποίο έχει προσβληθεί, μπορεί επίσης να νιώθει πόνο κατά τη διάρκεια της κίνησης του κεφαλιού.



# Κοινές Ασθένειες (16 από 35)

- Εκκρίσεις ωτός
- Οι επιπλοκές που σχετίζονται με τις εκκρίσεις ωτός πρέπει να αξιολογούνται βάσει της αιτιολογίας της κατάστασης.
- Όταν ξεκινήσει η διαρροή από το έξω ακουστικό πόρο, μπορεί να προκληθεί προσωρινή απώλεια ακοής.

# Κοινές Ασθένειες (17 από 35)

- Εγκεφαλίτιδα
- Η εγκεφαλίτιδα είναι μία φλεγμονή των εγκεφαλικών κυττάρων. Τα συμπτώματα της ήπιας εγκεφαλίτιδας είναι παρόμοια με αυτά των ιικών μολύνσεων. Συμπεριλαμβάνει πυρετό, πονοκέφαλο και απώλεια ενέργειας και όρεξης.

# Κοινές Ασθένειες (18 από 35)

- Εγκεφαλίτιδα
- Άλλα συμπτώματα και επιπλοκές περιλαμβάνουν η ευερεθιστότητα, η υπερκινητικότητα, η νύστα (η οποία μπορεί να είναι τόσο βαθειά όσο το κώμα σε σοβαρές περιπτώσεις), απώλεια μυικής δύναμης στα πόδια και στα χέρια, διπλωπία, εγκεφαλική δυσλειτουργία και ανικανότητα λόγου και ακοής. Τα μωρά και οι ηλικιωμένοι έχουν υψηλό κίνδυνο για τέτοιες επιπλοκές.

# Κοινές Ασθένειες (19 από 35)

- Εγκεφαλίτιδα
- Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκληθεί μόνιμη εγκεφαλική βλάβη.
- Βλάβες στη γλώσσα και την ομιλία μπορεί να υπάρχουν.
- Η ανάρρωση από ένα οξύ επεισόδιο εγκεφαλίτιδας μπορεί να είναι πολύ αργή και να απαιτεί μακροχρόνια αποκατάσταση.

# Κοινές Ασθένειες (20 από 35)

- Ερυθρά (Ρουμπιέλα)
- Η ερυθρά είναι μία μεταδοτική ιική ασθένεια, η οποία μοιάζει, αλλά σε πιο ήπια μορφή, με την κοινή ιλαρά. Χαρακτηρίζεται από μικρά, επίπεδα, κόκκινο-ροζ εξανθήματα που εμφανίζονται στο πρόσωπο και το λαιμό και απλώνονται στον κορμό και στα άκρα. Η ερυθρά είναι πιο συχνή στα παιδιά. Ο εμβολιασμός είναι διαθέσιμος σε άτομα μεγαλύτερα των 12 μηνών.

## Κοινές Ασθένειες (21 από 35)

- Οι έγκυες που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια ή έχουν λάβει εμβόλιο εντός τριών μηνών, βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές κατά την κύηση. Αυτές οι διαταραχές περιλαμβάνουν:
- Δυσμορφίες, μικροκεφαλία, υδροκεφαλία και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
- Καρδιακές και οπτικές ανωμαλίες
- Νοητική υστέρηση



## Κοινές Ασθένειες (21 από )

- Οι έγκυες που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια ή έχουν λάβει εμβόλιο εντός τριών μηνών, βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές κατά την κύηση. Αυτές οι διαταραχές περιλαμβάνουν:
- Κώφωση
- Προβλήματα συμπεριφοράς όπως υπερκινητικότητα, αρρυθμίες, ελλειμματική προσοχή και διαταραχές ύπνου
- Καθυστέρηση στην ανάπτυξη λόγου και ομιλίας



# Κοινές Ασθένειες (22 από 35)

- Μαστοειδίτιδα
- Η μαστοειδίτιδα είναι ένας ερεθισμός όλης ή μέρους της μαστοειδής απόφυσης. Εμφανίζεται πιο συχνά όταν μία λοίμωξη του μέσου ωτός επεκτείνεται στην μαστοειδή απόφυση. Τα συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν έντονο πόνο πίσω από το αυτί, πυρετό, μία ταχεία παλμική συχνότητα, εκκρίματα και φλεγμονή στο το αυτί που έχει προσβληθεί και απώλεια ακοής. Η μαστοειδεκτομή (μερική ή ολική αφαίρεση της μαστοειδούς απόφυσης) μπορεί να είναι απαραίτητη σε σπάνιες περιπτώσεις.

# Κοινές Ασθένειες (23 από 35)

- Μαστοειδίτιδα
- Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ομιλίας και γλώσσας που σχετίζονται με απώλεια ακοής.

# Κοινές Ασθένειες (24 από 35)

- Νόσος Ménière
- Η νόσος Ménière είναι μια νόσος του μέσου ωτός. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου αυτής περιλαμβάνουν εμβοές, περιστροφικό ίλιγγο, ένα αίσθημα πλήρωσης του μέσου ωτός και νευροαισθητήρια απώλεια ακοής. Αυτά τα συμπτώματα είναι επεισοδιακά, εξελισσόμενα και κυμαίνονται σε ένταση και συχνότητα. Η νόσος συχνά ξεκινά σαν μια μονόπλευρη συνθήκη, αλλά τελικά καταλήγει αμφίπλευρη.

# Κοινές Ασθένειες (25 από 35)

- Νόσος Ménière
- Ολική κώφωση στο ένα ή και τα δύο αυτιά μπορεί να υπάρξει.
- Σε βαριές περιπτώσεις ιλίγγου, το άτομο θα μπορούσε να πέσει και να υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι.

# Κοινές Ασθένειες (26 από 35)

- Μηνιγγίτιδα
- Η μηνιγγίτιδα είναι μία φλεγμονή των μηνίγγων (των μεμβρανών που καλύπτουν τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη). Βακτήρια ή οι ιοί μπορούν να εξαπλωθούν σε αυτές τις μεμβράνες μέσω της κυκλοφορίας του αίματος ή των κοιλοτήτων και των οστών του κρανίου ή από μία θλάση του κρανίου.



# Κοινές Ασθένειες (27 από 35)

- Μηνιγγίτιδα
- Τα συμπτώματα εμπεριέχουν πυρετό, πονοκέφαλο, ρίγη, ναυτία, εμετούς, ευερεθιστότητα, δυσκαμψία λαιμού, σύγχυση και φωτοφοβία (αδυναμία να ανεχτεί το δυνατό φως). Μπορεί να παρουσιαστεί βαθύ κόκκινο ή μωβ δέρμα, σε κάποιες περιπτώσεις.

# Κοινές Ασθένειες (28 από 35)

- Μηνιγγίτιδα
- Ο ιός της μηνιγγίτιδας συνήθως δεν παρουσιάζει σχετικές επιπλοκές. Η ιική μηνιγγίτιδα διαφέρει από τη βακτηριακή τύπου λοίμωξη, παρόλα αυτά, είναι μία σοβαρή κατάσταση που απαιτεί επιθετική ιατρική θεραπεία. Διαταραχές που σχετίζονται με βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα, περιέχουν σπασμούς, κώμα, μόνιμη κώφωση, μόνιμη τύφλωση, νοητική υστέρηση ή θάνατο. Τα μωρά και οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε επιπλοκές.



# Κοινές Ασθένειες (29 από 35)

- Μηνιγγίτιδα
- Η εγκεφαλική βλάβη μπορεί να βρίσκεται σε σοβαρές περιπτώσεις.
- Προβλήματα γλώσσας και ομιλίας που σχετίζονται με απώλεια ακοής ή νευρολογικά προβλήματα μπορεί να υπάρξουν.

# Κοινές Ασθένειες (30 από 35)

- Παρωτίτιδα
- Η παρωτίτιδα είναι μία μεταδοτική ιική λοίμωξη των σιελογόνων αδένων, ειδικά των παρωτιδικών αδένων που βρίσκονται ακριβώς πριν από τα αυτιά. Το άτομο που έχει προσβληθεί μπορεί να βιώσει δυσκολία στο άνοιγμα του στόματος, ξηροστομία, πόνο κατά τη διάρκεια της κατάποσης, πυρετό, διάρροια, εμετό και γενικό αίσθημα αδιαθεσίας.

# Κοινές Ασθένειες (31 από 35)

- Παρωτίτιδα
- Από τη στιγμή που ο ιός της παρωτίτιδας εισέλθει στο σώμα, μπορεί να περάσει από την κυκλοφορία του αίματος σε πολλούς διαφορετικούς αδένες και τον εγκέφαλο. Οι μαγουλάδες μπορούν να συμβούν σε κάθε ηλικία, αλλά είναι πιο συχνές στα παιδιά μεταξύ των ηλικιών 5 και 15 ετών. Ο εμβολιασμός είναι διαθέσιμος για παιδιά άνω των 12 μηνών.



# Κοινές Ασθένειες (32 από 35)

- Παρωτίτιδα
- Μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, παγκρεατίτιδα, πυρετικούς σπασμούς, λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος ή λοιμώξεις του ωτός μπορούν να εμφανιστούν ως επιπλοκές.
- Μπορεί να προκύψει ήπια μέχρι σοβαρή απώλεια ακοής, η οποία είναι τυπικά (αλλά όχι αποκλειστικά) μονόπλευρη.



# Κοινές Ασθένειες (33 από 35)

- Μέση Ωτίτιδα
- Η μέση ωτίτιδα είναι μία μόλυνση του μέσου ώτος. Η μόλυνση μπορεί να είναι βακτηριδιακή ή ιική, και συνήθως επεκτείνεται από τη μύτη και το λαιμό προς το αφτί μέσω της ευσταγχιανής σάλπιγγας. Η μόλυνση μπορεί επίσης να εισέλθει στο μέσω αφτί από τον διαρρηγμένο τυμπανικό υμένα.

# Κοινές Ασθένειες (34 από 35)

- Μέση Ωτίτιδα
- Τα συμπτώματα της μέσης επίκτητης ωτίτιδας περιλαμβάνει την αίσθηση μιας πληρότητας στη μολυσμένη περιοχή του αυτιού η οποία ακολουθείται από πόνο, πυρετό, και απώλεια ακοής. Αν δεν θεραπευτεί η επίκτητη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια μέση ωτίτιδα, η οποία είναι πολύ πιο σοβαρή και να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Η μέση ωτίτιδα είναι πολύ συχνή μεταξύ των παιδιών, ειδικά σε αυτά που είναι κάτω από έξι ετών.

# Κοινές Ασθένειες (35 από 35)

- Μέση Ωτίτιδα
- Η μέση ωτίτιδα είναι σχεδόν σχετιζόμενη με την προσωρινή απώλεια της ακοής. Αυτό μπορεί απευθείας να επηρεάσει την ομιλία και την γλωσσική ανάπτυξη και της κατάκτησης της ομιλίας και της γλώσσας.
- Η αυξανόμενη πίεση στο μέσω αυτί μπορεί να οδηγήσει στην ρήξη του τυμπανικού υμένα.
- Μια μόνιμη απώλεια της ακοής μπορεί να συμβεί σε χρόνιες καταστάσεις.



# Βιβλιογραφία

- Haynes, W.O., & Pindzola, R.H. (2004). *Diagnosis and evaluation in speech pathology*. Boston: Allyn & Bacon
- Hegde, M. N. (1996). *Pocket-Guide to assessment in speech-language pathology*. Singular Publishing Group.
- Καμπανάρου, Μ. (2007). *Διαγνωστικά θέματα Λογοθεραπείας*. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.
- ShIPLEY, K. G., & McAfee, J. G. (2009). *Assessment in speech-language pathology: A resource manual (4th ed.)*. San Diego, CA: Singular Publishing Group.





# Σημείωμα Αναφοράς

Ταφιάδης Δ. Κλινική άσκηση στη Λογοπαθολογία 1. ΤΕΙ  
Ηπείρου. Διαθέσιμο από:

<http://eclass.teiep.gr/courses/LOGO135/>

# Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».



Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el>



# Τέλος Ενότητας



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης





# Σημειώματα

# Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- το Σημείωμα Αναφοράς
- το Σημείωμα Αδειοδότησης
- τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
- το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

# Τέλος Ενότητας



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

