

Το κόκκινο σκαθάρι των φοινίκων

Ελένη Κυζιρίδου,
Γεωπόνος,
Φυτοϋγειονομικός Ελεγκτής
ΔΑΟΚ ΠΕ Άρτας.

ΒΟΤΑΝΙΚΗ

- Οικογένεια *Arecaceae* ή *Palmae*
- περιλαμβάνει γύρω στα 2500 είδη και παίζουν κυρίως καλλωπιστικό ρόλο αλλά υπάρχουν και παραγωγικά φυτά όπως η χουρμαδιά.

Τα φοινικοειδή στην Ελλάδα

- *Phoenix canariensis*



Αγία Θεοδώρα, Αρτας
Agia Theodora church, Arta
Photo: Harry Gouvas, 2006



Chamaerops humilis



Phoenix theophrastii



Washingtonia sp

Phoenix dactylifera



Οι εχθροί των φοινικοειδών

Rhyncophorus ferrugineus

- Ιανουάριος του 2006 το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Ελλάδα
- Σε φοινικοειδή του είδους *Phoenix canariensis* σε δενδροστοιχία του Δήμου Ηρακλείου

Αριθμός κρουσμάτων

- Τα στοιχεία μέχρι το τέλος του 2013 για επιβεβαιωμένα κρούσματα
- Σε 38 Περιφερειακές Ενότητες
- Βρεθήκαν 5038 προσβεβλημένα
- Προσωπική εκτίμηση τουλάχιστο διπλάσια
- Δεν βρέθηκαν κρούσματα σε φυτώρια

Βιολογικός κύκλος ρυγχοφόρου



Μέτρα αντιμετώπισης

- Πρακτικά δεν υπάρχουν
- Ψεκασμοί
- Δενδροχειρουργική
- Παρασιτικοί νηματώδεις και μύκητες

Επιβλαβής Οργανισμός καραντίνας

- Επισκοπήσεις
- Μακροσκοπικός έλεγχος: οπτικός και ακουστικός
- Φερομονικές παγίδες

Συμπτώματα



Εικόνα «ανοιχτής ομπρέλας»





Φυτουγειονομικός έλεγχος

- Σχέδιο δράσης ανά Περιφερειακή Ενότητα
- Εφόσον βρεθούν προσβολές :
- Οριοθέτηση ζωνών 1. μια μολυσμένη ζώνη, 2 μια ουδέτερη ζώνη σε απόσταση τουλάχιστο 10 χλμ από τη μολυσμένη ζώνη
- Προς το παρόν στην ΠΕ Άρτας ως προσβεβλημένη ζώνη το σύνολο της έκτασης του Δήμου Αρταίων και ως ουδέτερη ζώνη το υπόλοιπο της ΠΕ Άρτας



Κοπή-καταστροφή



Paysadisia archon





Ευχαριστώ για την προσοχή σας